

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : GAEC DE LA HAUTEFEUILLE

Fumier de porc Solide
sous type effluent Type I-d

N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
				Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
	15	W15	100 %	5,12	5,12	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	0,91	Pas d'engorgement	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
	E1	E1.1	33 %	16,58	5,47	limon sablo-argileux	Assez battant (Ib= 1,7)	Absence	0,89	Pas d'engorgement	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
	E1	E1.2	33 %	16,58	5,47	limon	Très battant (Ib= 2,5)	Absence	0,92	Pas d'engorgement	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
	E1	E1.3	33 %	16,58	5,47	limon	Très battant (Ib= 2,5)	Absence	0,94	Pas d'engorgement	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
	E10	E10	100 %	5,6	5,60	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,85	Pas d'engorgement	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
	E11	E7	100 %	0,46	0,46	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	0,84	Pas d'engorgement	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : GAEC DE LA HAUTEFEUILLE

Fumier de porc Solide
sous type effluent Type I-d

N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
				Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
	E2	E2	100 %	4,07	4,07	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	0,89	Pas d'engorgement	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
	E3	E3	100 %	4,73	4,73	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,84	Pas d'engorgement	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
	E4	E4.1	50 %	10,17	5,09	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,81	Pas d'engorgement	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
	E4	E4.2	50 %	10,17	5,09	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,81	Pas d'engorgement	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
	E5	E5	100 %	7,8	7,80	limon	Très battant (Ib= 2,5)	Absence	0,84	Pas d'engorgement	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
	E6	E3	100 %	2,19	2,19	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,84	Pas d'engorgement	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : GAEC DE LA HAUTEFEUILLE

Fumier de porc Solide
sous type effluent Type I-d

N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
				Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
	E7	E7	100 %	21,97	21,97	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	0,84	Pas d'engorgement	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
	E8	E8	100 %	3,4	3,40	limon	Très battant (Ib= 2,5)	Absence	0,89	Pas d'engorgement	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
	E9	E9	100 %	2,22	2,22	limon	Très battant (Ib= 2,5)	Absence	0,89	Pas d'engorgement	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
	T1	T1	100 %	7,96	7,96	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,70	Pas d'engorgement	1
Epandage suivi ou sur couvert végétal											
	T10	T10	100 %	3,46	3,46	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,33	Pas d'engorgement	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
	T11	T11	100 %	2,86	2,86	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	0,36	Pas d'engorgement	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : GAEC DE LA HAUTEFEUILLE

Fumier de porc Solide
sous type effluent Type I-d

N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
				Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
	T12	T10	100 %	2,2	2,20	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,33	Pas d'engorgement	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
	T13	T13	100 %	14,31	14,31	limon	Très battant (Ib= 2,5)	Absence	0,87	Pas d'engorgement	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
	T15	T15	100 %	7,93	7,93	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	0,86	Pas d'engorgement	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
	T16	T27	100 %	4,87	4,87	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,82	Pas d'engorgement	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
	T17	T15	100 %	0,84	0,84	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	0,86	Pas d'engorgement	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
	T18	T20	100 %	1,44	1,44	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	0,89	Pas d'engorgement	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : GAEC DE LA HAUTEFEUILLE

Fumier de porc Solide
sous type effluent Type I-d

N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
				Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
	T19	T20	100 %	1,33	1,33	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	0,89	Pas d'engorgement	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
	T2	T29	100 %	4,74	4,74	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,70	Pas d'engorgement	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
	T20	T20	100 %	2,84	2,84	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	0,89	Pas d'engorgement	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
	T21	T20	100 %	1,25	1,25	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	0,89	Pas d'engorgement	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
	T23	E10	100 %	1,16	1,16	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,85	Pas d'engorgement	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
	T26	T26	100 %	5,72	5,72	argile limono-sableuse	Peu battant (Ib= 0,8)	Absence	0,81	Pas d'engorgement	1
Epandage suivi ou sur couvert végétal											

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : GAEC DE LA HAUTEFEUILLE

Fumier de porc Solide
sous type effluent Type I-d

N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
				Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
	T27	T27	100 %	2,1	2,10	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,82	Pas d'engorgement	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
	T28	W5-1	100 %	1,97	1,97	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	0,81	Pas d'engorgement	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
	T29	T29	100 %	4,98	4,98	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,70	Pas d'engorgement	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
	T3	T3	100 %	7,37	7,37	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,79	Pas d'engorgement	1
Epandage suivi ou sur couvert végétal											
	T31	T31	100 %	6,64	6,64	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,82	Pas d'engorgement	1
Epandage suivi ou sur couvert végétal											
	T4	T4	100 %	8,49	8,49	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,79	Pas d'engorgement	1
Epandage suivi ou sur couvert végétal											

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : GAEC DE LA HAUTEFEUILLE

Fumier de porc Solide
sous type effluent Type I-d

N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
				Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
	T5	T5	100 %	3,57	3,57	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	0,85	Pas d'engorgement	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
	T6	T6	100 %	11,33	11,33	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,79	Pas d'engorgement	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
	T7	T11	100 %	0,56	0,56	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	0,36	Pas d'engorgement	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
	T8	T8	100 %	2,28	2,28	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,33	Pas d'engorgement	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
	T9	T8	100 %	1,25	1,25	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,33	Pas d'engorgement	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
	W1	T5	100 %	1,85	1,85	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	0,85	Pas d'engorgement	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : GAEC DE LA HAUTEFEUILLE

Fumier de porc Solide
sous type effluent Type I-d

N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
				Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
	W10	W10	100 %	2,01	2,01	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	0,89	Pas d'engorgement	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
	W11	W10	100 %	2,3	2,30	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	0,89	Pas d'engorgement	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
	W12	W10	100 %	1,39	1,39	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	0,89	Pas d'engorgement	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
	W13	W13	100 %	4,65	4,65	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	0,00	Pas d'engorgement	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
	W14	W16	100 %	3,39	3,39	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	0,91	Pas d'engorgement	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
	W16	W16	100 %	2,25	2,25	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	0,91	Pas d'engorgement	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : GAEC DE LA HAUTEFEUILLE

Fumier de porc Solide
sous type effluent Type I-d

N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
				Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
	W17	W17	100 %	4,43	4,43	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,90	Pas d'engorgement	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
	W18	W18	100 %	7,7	7,70	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,87	Pas d'engorgement	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
	W19	W19	100 %	4,33	4,33	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	0,91	Pas d'engorgement	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
	W2	W2	100 %	7,09	7,09	limon	Très battant (Ib= 2,5)	Absence	0,18	Pas d'engorgement	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
	W20	W20	100 %	3	3,00	limon	Très battant (Ib= 2,5)	Absence	0,88	Pas d'engorgement	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
	W21	W30	100 %	2,65	2,65	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	0,89	Pas d'engorgement	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : GAEC DE LA HAUTEFEUILLE

Fumier de porc Solide
sous type effluent Type I-d

N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
				Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
	W23	W22	100 %	1,3	1,30	limon	Très battant (Ib= 2,5)	Absence	0,92	Pas d'engorgement	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
	W24	W24-1	33 %	5,89	1,94	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,94	Pas d'engorgement	1
Epandage suivi ou sur couvert végétal											
	W24	W24-2	33 %	5,89	1,94	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	0,81	Pas d'engorgement	1
Epandage suivi ou sur couvert végétal											
	W24	W24-3	33 %	5,89	1,94	limon	Très battant (Ib= 2,5)	Absence	0,29	Pas d'engorgement	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
	W25	W25	100 %	2,25	2,25	limon	Très battant (Ib= 2,5)	Absence	1,17	Pas d'engorgement	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
	W26	W26	100 %	5,87	5,87	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,87	Pas d'engorgement	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : GAEC DE LA HAUTEFEUILLE

Fumier de porc Solide
sous type effluent Type I-d

N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
				Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
	W27	W27	100 %	6,44	6,44	limon	Très battant (Ib= 2,5)	Absence	0,18	Pas d'engorgement	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
	W28	W28	100 %	3,1	3,10	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	0,99	2 à 6 mois	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol											
	W29	W29	100 %	4,3	4,30	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	0,83	Pas d'engorgement	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
	W3	W3	100 %	2,85	2,85	limon	Très battant (Ib= 2,5)	Absence	0,78	Pas d'engorgement	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
	W30	W30	100 %	11,85	11,85	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	0,89	Pas d'engorgement	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
	W33	W33	100 %	2,97	2,97	limon	Très battant (Ib= 2,5)	Absence	0,76	< 2 mois	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol											

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : GAEC DE LA HAUTEFEUILLE

Fumier de porc Solide
sous type effluent Type I-d

N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
				Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
	W34	W34	100 %	2,46	2,46	limon	Très battant (Ib= 2,5)	Absence	0,76	Pas d'engorgement	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
	W35	W36	100 %	0,18	0,18	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	0,78	Pas d'engorgement	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
	W36	W36	100 %	2,65	2,65	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	0,78	Pas d'engorgement	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
	W4	W4	100 %	6	6,00	limon	Très battant (Ib= 2,5)	Absence	0,69	< 2 mois	1
Epandage suivi ou sur couvert végétal, pas d'épandage en période d'engorgement du sol											
	W5	W5-1	50 %	13,57	6,78	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	0,81	Pas d'engorgement	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
	W5	W5-2	50 %	13,57	6,78	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	0,71	Pas d'engorgement	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : GAEC DE LA HAUTEFEUILLE

Fumier de porc Solide
sous type effluent Type I-d

N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
				Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
	W6	W2	100 %	0,35	0,35	limon	Très battant (Ib= 2,5)	Absence	0,18	Pas d'engorgement	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
	W7	W7.1	100 %	13,86	13,86	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	1,13	Pas d'engorgement	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
	W8	W8	100 %	3,84	3,84	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	1,13	Pas d'engorgement	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
	W9	W9.1	50 %	10,65	5,32	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	1,13	Pas d'engorgement	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
	W9	W9.2	50 %	10,65	5,32	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	1,13	Pas d'engorgement	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											